

ACTUALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

El 28 de septiembre de 2023, el Grupo Técnico Asesor de Expertos (SAGE) sobre inmunizaciones de la OMS actualizó su Hoja de ruta para la vacunación contra COVID-19.

SERIE PRIMARIA

Tras cuatro años de pandemia, la mayoría de las personas del mundo tienen inmunidad contra el virus del SARS-CoV-2 a través de la infección, de la vacunación o ambas. En esta fase de la pandemia, los beneficios de una serie primaria de vacunación de dos dosis son limitados.

Los países pueden reducir sus tasas de morbilidad y mortalidad garantizando que todas las personas reciban al menos una dosis de vacuna contra COVID-19.



DOSIS DE REFUERZO

Las personas de los grupos de alta prioridad tienen la mayor probabilidad de enfermarse gravemente o de morir. Cualquier disminución en la eficacia de la vacuna, por pequeña que sea, aumenta el número de personas que se enferman gravemente o pueden morir. Por lo tanto, la **vacunación con dosis de refuerzo sólo se recomienda para las personas de los grupos de alta prioridad.**

A continuación, puede ver para quién, cuándo y cuántas dosis se recomiendan para los distintos grupos poblacionales.



GRUPOS DE ALTA PRIORIDAD



Debe recibir una dosis de refuerzo adicional 6 meses después de la última dosis:

- Adultos muy mayores (más de 75 años).
- Adultos mayores con comorbilidades (60 a 75 años).
- Personas embarazadas.

Debe recibir una dosis de refuerzo adicional 12 meses después de la última dosis:

- Adultos mayores (60 a 75 años).
- Adultos con comorbilidades u obesidad severa (de 18 a 59 años).
- Personal de salud de primera línea.

GRUPOS DE PRIORIDAD MEDIA



No se recomiendan dosis de refuerzo adicionales para:

- Personas de 18 años en adelante
- Niños y adolescentes con comorbilidades (de 6 meses a 17 años)

GRUPOS DE BAJA PRIORIDAD




No se recomiendan dosis de refuerzo adicionales para:

- Niños y adolescentes sanos

PERSONAS INMUNODEPRIMIDAS

Las personas de 6 meses en adelante con sistemas inmunitarios comprometidos se incluyen en el grupo de alta prioridad.

El SAGE recomienda que las personas inmunodeprimidas sigan recibiendo una serie primaria de 2-3 dosis contra COVID-19, en consulta con un profesional sanitario. Además, deben recibir una dosis de refuerzo adicional 6 meses después de la última dosis.



PRÓXIMOS PASOS

- Los países deben seguir centrándose en lograr altas tasas de cobertura de vacunación entre los grupos de alto prioritarios. Esto incluye a los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con comorbilidades, las personas inmunodeprimidas y los trabajadores de salud.
- En este momento, los países pueden utilizar cualquier vacuna contra COVID-19 que tenga aprobación EUL de la OMS para vacunar a la población, ya que todas protegen contra la enfermedad grave y la muerte. No se recomienda suspender las operaciones de vacunación a la espera de que esté disponible la nueva vacuna monovalente XBB.1.5.



Más información:
www.paho.org/es/vacunas-contracovid-19

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud